

Назва препарату	Лікарська форма	Склад	Фармакологічні властивості	Показання до застосування	Назва препарату	Лікарська форма	Склад	Фармакологічні властивості	Показання до застосування
Праміпексол IC 	Таблетки №30. UA/15526/01/01 UA/15526/01/02	Склад 1 таблетки: праміпексолу дигідрохлориду моногідрату 0,25 мг, 1 мг.	Полегшує паркінсонічні рухові порушення шляхом стимуляції дофамінових рецепторів стрітуму (смугастого тіла).	Лікування симптомів ідіопатичної хвороби Паркінсона у дорослих як монотерапія або у комбінації з леводопою. Симптоматичне лікування ідіопатичного синдрому неспокійних ніг від помірного до тяжкого ступеня у дорослих.	Бупрен® IC 	Таблетки сублінгвальні №10. UA/10202/01/01 UA/10202/01/04 UA/10202/01/02	Склад 1 таблетки: бупренорфіну гідрохлориду 0,2 мг або 0,4 мг.	Опіоїдний анагетик.	Гострий та хронічний больовий синдром високої інтенсивності.
П'ятирчатка® IC 	Таблетки №10. UA/8698/01/01	Склад 1 таблетки: метамізолу натрію моногідрату 300 мг, парацетамолу 200 мг, кофеїн-бензоату натрію 50 мг (у перерахунку на кофеїн 20 мг), фенобарбіталу 10 мг, кодеїну фосфату гемігідрату 9,5 мг (у перерахунку на кодеїн основу 7 мг).	Комбінований препарат, чинить знеболювальну, жарознижувальну та протизапальну дію.	Виразений больовий синдром різного генезу (у суглобах, м'язах, радикуліт, менструальний біль, невралгії, а також головний та зубний біль, мігрень). Застудні і пропасні стани, що супроводжуються больовими симптомами та явищами запалення.	Бупрен® IC 	Таблетки сублінгвальні №10. UA/10202/01/04 UA/10202/01/03 UA/10202/01/02	Склад 1 таблетки: бупренорфіну гідрохлориду 0,4 мг, 2 мг, 8 мг.	Опіоїдний анагетик.	Замісна терапія опіоїдної залежності.
Пенталгін IC® 	Таблетки №10. UA/8694/01/01				Клоназепам IC 	Таблетки 0,5 мг №50, 1 мг №50, 2 мг №30. UA/4532/01/01 UA/4532/01/02 UA/4532/01/03	Склад 1 таблетки: клоназепаму – 0,5 мг, 1 мг, 2 мг	Похідне бензодіазепіну. Чинить сильну і тривалу протисудомну дію; анксіолітичну, седативну, помірну снодійну, а також помірну міорелакснтну дію.	Епілепсія. Синдром пароксизмального страху, стан страху при фобіях.
Pericol® IC 	Порошок для орального розчину №10. UA/14661/01/01	Склад 1 саше: натрію хлориду 3,5 г, калію хлориду 2,5 г, натрію цитрату 2,9 г, глюкози 10,0 г.	Препарат електролітів із вуглеводами для відновлення водно-електролітної рівноваги.	Відновлення водно-електролітної рівноваги, корекція ацидозу при гострій діареї. Теплові ураження, що супроводжуються порушенням водно-електролітного обміну.	Метафін® IC 	Таблетки 5 мг №50, 10 мг №50, 25 мг №40. UA/14448/01/01 UA/14448/01/02 UA/14448/01/03	Склад 1 таблетки: метадону гідрохлориду 5 мг, 10 мг, 25 мг.	Синтетичний опіоїдний аналгетик.	Для детоксикації при лікуванні опіоїдної залежності. Больовий синдром від помірного до сильного.
Ривастигмін IC 	Капсули №30. UA/16388/01/01 UA/16388/01/02	Склад 1 капсули: ривастигміну 1,5 мг, 3 мг.	Інгібітор ацетилхолінестерази і бутирилхолінестерази карбаматного типу. Чинить сприятливий ефект на когнітивний дефіцит при деменції.	Симптоматичне лікування деменції від незначного до помірного ступеня, обумовленої хворобою Альцгеймера, та у пацієнтів з ідіопатичною хворобою Паркінсона.	Морфіну сульфат 	Таблетки №10, №50. UA/12735/01/02	Склад 1 таблетки: морфіну сульфату 10 мг.	Опіоїдний анагетик.	Больовий синдром сильної інтенсивності.
Розувастатин IC 	Таблетки вкриті плівковою оболонкою №30. UA/15855/01/01 UA/15855/01/02 UA/15855/01/03 UA/15855/01/04	Склад 1 таблетки: розувастатину 5 мг, 10 мг, 20 мг, 40 мг.	Гіполіпідемічний засіб.	Лікування гіперхолестеринемії. Профілактика серцевосудинних порушень.	Сибазон® IC 	Таблетки №20. UA/4828/01/01 UA/4828/01/02	Склад 1 таблетки: діазепаму 5 мг, 10 мг.	Похідне бензодіазепіну. Чинить анксіолітичну, центрально міорелаксуючу, протисудомну, седативну та помірну снодійну дію.	Тривожні розлади. Безсоння. Усунення м'язових спазмів Премедикація при незначних хірургічних втручаннях.
Теофедрин IC® 	Таблетки №10. UA/9230/01/01	Склад 1 таблетки: теофіліну безводного 100 мг, кофеїну безводного (у перерахуванні на моногідрат) 50 мг, фенобарбіталу 20 мг, ефедрину гідрохлориду 20 мг, парацетамолу 200 мг, красавки (беладони) екстракту сухого 3 мг, цитизину 0,1 мг.	Комбінований препарат, що збільшує просвіт бронхів, розширює судини легень та збільшує серцевий кровотік.	Хронічний бронхіт, бронхіальна астма, хронічні обструктивні захворювання легень (ХОЗЛ).	Феназепам® IC 	Таблетки №50. UA/8564/01/01 UA/8564/01/02	Склад 1 таблетки: Феназепам® 0,5 мг, 1 мг.	Похідне бензодіазепіну. Чинить анксіолітичну, протисудомну, міорелаксуючу та снодійну дії.	Невротичні, неврозоподібні, психопатичні, психопатоподібні стани, іпохондрично-синестопатичний синдром, вегетативні дисфункції.
Транквілар® IC 	Таблетки №20. UA/8851/01/01	Склад 1 таблетки: темгіколурилу 300 мг.	Знімає або послаблює почуття занепокоєння, тривогу, страх. Не виявляє снодійного ефекту.	Кардіалгії різного генезу, прояви при передменструальному синдромі та менопаузі. У складі комплексної терапії нікотинової залежності.	Фенобарбітал IC 	Таблетки №50. UA/4052/01/01 UA/4052/01/02 UA/4052/01/03	Склад 1 таблетки: фенобарбіталу 5 мг, 50 мг, 100 мг.	Похідне барбітурової кислоти. Чинить виражену протисудомну дію, знижує збудженість нейронів епілептичної локалізації.	Епілепсія, хорея, спастичні паралічі, спазм периферичних артерій, еклампсія, гемолітична хвороба новонароджених.
Флумібакт® IC 	Таблетки вагінальні №6. UA/15786/01/01	Склад 1 таблетки: 10 мг деквалінію хлориду.	Четвертинна амонієва сполука із широким антимікробним спектром дії проти різних грампозитивних та грамнегативних бактерій, грибів та найпростіших одноклітинних організмів (Trichomonas vaginalis).	Вагінальні інфекції бактеріального та грибового походження (наприклад бактеріальний вагіноз та кандидоз). Трихомоніаз. Санація перед гінекологічними втручаннями та пологами.	Інформація в таблиці викладена стисло. Детальна інформація наведена в інструкції для медичного застосування.				
Цикотин® IC 	Таблетки вкриті плівковою оболонкою №100. UA/20300/01/01	Склад 1 таблетки: цитизину 1,5 мг.	Зменшує нікотинову залежність шляхом полегшення симптомів синдрому відміни.	Лікування нікотинової залежності з метою відмови від паління без симптомів синдрому відміни.					
Кодесан® IC 	Таблетки №10. UA/8687/01/01	Склад 1 таблетки: кодеїну 9,5 мг, термопсису екстракту сухого 20 мг, солодки кореня 200 мг, натрію гідрокарбонату 200 мг.	Комбінований протикашльовий засіб.	Кашель при захворюваннях легень і дихальних шляхів.					

Інформація в таблиці викладена стисло. Детальна інформація наведена в інструкції для медичного застосування.





Інформація для професійної діяльності медичних та фармацевтичних працівників,
а також для розповсюдження на спеціалізованих семінарах, конференціях,
симпозіумах з медичної тематики.

ТДВ «ІНТЕРХІМ» Україна, 65080, м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, буд. 86
Телефон (048) 777 29 50
Ліцензія АЕ 295499
Виробництво препаратів відповідає вимогам GMP ЕС і ВООЗ
Сертифікат 012/2026/GMP. info@interchem.com.ua



Ліки
з добрих рук



Назва препарату	Лікарська форма	Склад	Фармакологічні властивості	Показання до застосування	Назва препарату	Лікарська форма	Склад	Фармакологічні властивості	Показання до застосування	Назва препарату	Лікарська форма	Склад	Фармакологічні властивості	Показання до застосування	
Алкодез® IC 	Таблетки №4. UA/12717/01/01	Склад 1 таблетки: метадоксину 0,5 г.	Антиалкогольний, дезінтоксикаційний, гепатопротекторний засіб.	Зменшення токсичної дії алкоголю. Гостра алкогольна інтоксикація (легкої та середньої тяжкості). Алкогольний абстинентний синдром.	Бензонал IC® 	Таблетки 0,05 г №30; 0,1 г №50. UA/9793/01/01 UA/9793/01/02	Склад 1 таблетки: бензобарбіталу 50 мг, 100 мг.	Протиепілептичний засіб.	Різні форми епілепсії. У складі комплексної терапії гемолітичної хвороби новонароджених.	Кардітаб IC 	Таблетки №10, №20. UA/14659/01/01 Таблетки сублінгвальні №10. UA/14659/02/01	Склад 1 таблетки: фенобарбіталу 7,5 мг, етилового ефіру α-бромізовалеріанової кислоти 8,2 мг, олії м'яти 0,58 мг.	Комбінований седативний, судинорозширювальний та спазмолітичний засіб.	Неврози. Безсоння. У комплексній терапії гіпертонічної хвороби та вегето-судинної дистонії. Кардіалгія, тахікардія. Спазми кишечника.	
Аміксин® IC 	Таблетки, вкриті оболонкою №3, №6, №10. UA/2559/01/01 UA/2559/01/02	Склад 1 таблетки: тилорону 125 мг (для дорослих), 60 мг (для дітей від 7 років).	Імунomodulatory та противірусний засіб. Стимулює утворення в організмі α-, β-, γ-інтерферонів.	Дорослі. Для лікування і профілактики грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій. У складі комплексної терапії інших вірусних інфекцій. Діти старше 7 років. Лікування грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій.	Біфок® IC 	Таблетки №10. UA/14315/01/01	Склад 1 таблетки: ібупрофену 200 мг, кодеїну фосфату гемідрату (у перерахунку на кодеїну основу моногідрат) 10 мг.	Комбінований знеболювальний і жарознижувальний засіб.	Для короточасного лікування гострого, помірного болю, який не купірується іншими анагетиками, такими як парацетамол, ібупрофен або ацетилсаліцилова кислота.	Кардітаб® IC Фіто 	Таблетки вкриті плівковою оболонкою №10 UA/15572/01/01	Склад 1 таблетки: валеріани екстракту водно-спиртового сухого 40 мг, етилового ефіру α-бромізо-валеріанової кислоти 8,2 мг, олії м'яти 0,58 мг.	Седативний, спазмолітичний, судинорозширювальний засіб. Сприяє зниженню збудливості центральної нервової системи, чинить заспокійливу дію та полегшує настання природного сну.	Підвищена нервова збудливість, безсоння. У складі комбінованої терапії при легких функціональних порушеннях з боку серцево-судинної системи.	
Амілар® IC 	Таблетки для розсмоктування №16. UA/14891/01/01 UA/14892/01/01 UA/14893/01/01	Склад 1 таблетки: деквалінію хлориду 0,25 мг, дибукаїну гідрохлориду 0,03 мг.	Комбінований препарат, чинить бактерицидну, фунгістатичну та знеболювальну дію у ротовій порожнині.	Місцеве лікування гострих запальних захворювань ротової порожнини та горла.	Вітамін С 	Таблетки жувальні зі смаком апельсину №24. UA/16002/01/01	Склад 1 таблетки: аскорбінової кислоти 199,5 мг, натрію аскорбату 338,0 мг (у перерахунку на аскорбінову кислоту 300,5 мг).	Аскорбінова кислота бере участь в регуляції обміну вуглеводів, ліпідів та білків, впливає на метаболізм інсуліну, заліза, необхідна для синтезу проколагену, колагену та регенерації сполучної та кісткової тканин.	Забезпечення підвищеної потреби організму в аскорбіновій кислоті: • при гострих респіраторних та інших інфекційних захворюваннях; • після тяжких захворювань, оперативних втручань; • при кровотечах (носові, легеневі, маткові); • при променевій хворобі, гепатиті, холециститі.	Клофелін IC 	Таблетки №50. UA/16533/01/02	Склад 1 таблетки: клонідину гідрохлориду 0,15 мг.	Клонідин – агоніст α2-адренорецепторів, імідазолінових рецепторів, гіпотензивний засіб центральної дії, який діє на рівні нейрогуморальної регуляції судинного тонуcу.	Артеріальна гіпертензія (есенціальна або вторинна) у складі комплексного лікування.	
Аміфена® IC 	Таблетки, вкриті плівковою оболонкою №20. UA/16620/01/01 UA/16620/01/02	Склад 1 таблетки: мефенамінової кислоти 250 мг, 500 мг.	Мефенамінова кислота — нестероїдний протизапальний засіб, який чинить протизапальну, знеболювальну і жарознижувальну дію.	Біль низької та середньої інтенсивності: м'язовий, суглобовий, травматичний, зубний, головний біль різної етіології, післяопераційний, післяпологовий. Первинна дисменорея. Дисфункціональні менорегії.	Гідазепам IC® 	Таблетки 0,02 г №10, №20, №30, 0,05 г №10, №20. UA/8579/01/01 UA/8579/01/02	Склад 1 таблетки: 1-(гідразінокарбоніл)-метил-7-бром-5-феніл-1,2-дигідро-3Н-1,4-бенздіазепін-2-он 20 мг або 50 мг.	«Денний» транквілізатор. Після перорального прийому одноразових доз дія препарату проявляється через 30–60 хв. Після сублінгвального прийому дія проявляється через 5–15 хв.	При станах, які супроводжуються тривогою, страхом (у тому числі перед хірургічними втручаннями та болісними діагностичними обстеженнями), підвищеною дратівливістю, порушенням сну.	Левана® IC 	Таблетки 0,5 мг №20; 1 мг и 2 мг №10. UA/11175/01/01 UA/11175/01/02 UA/11175/01/03	Склад 1 таблетки: Левана® 0,5 мг, 1 мг, 2 мг.	Чинить виражену снодійну, ансіолітичну дію, забезпечує фізіологічний снодійний ефект.	Розлади сну різної етіології у дорослих, зокрема, аномальне та транзиторне безсоння.	
Аміцитрон® Аміцитрон® Без цукру	Порошок для орального розчину №10.	Склад 1 саше: парацетамолу 500 мг, фенілефрину гідрохлориду 10 мг, феніраміну малеату 20 мг, кислоти аскорбінової 50 мг.	Жарознижувальний, антигістамінний, судинорозширювальний препарат.	Симптоматичне лікування гострих респіраторних інфекцій та грипу: підвищеної температури тіла, головного болю, закладеності носа, нежитю, болю та ломоти у м'язах.		UA/13911/01/01 UA/13912/01/01 UA/14116/01/01 UA/14117/01/01	Гінкгоба® 	Капсули №20, №60. UA/15691/01/01 UA/15691/01/02 UA/15691/01/03	Склад 1 капсули: гінкго екстракту сухого (Folium Ginkgo) (39,6-49,5:1) (екстрагент етанол 50 %) 40 мг, 80 мг, 120 мг.	Препарат збільшує кровотік, нормалізує мікроциркуляцію, підвищує переносимість гіпоксії, запобігає агрегації еритроцитів, гальмує фактор активації тромбоцитів.	Ліверія® IC 	Таблетки №20. UA/13164/01/01	Склад 1 таблетки: метадоксину 0,5 г.	Запобігає накопиченню жирів у гепатоцитах та перешкоджає утворенню фібрoneктину і колагену — гальмує процес формування цирозу печінки.	Комплексна терапія хвороб печінки, особливо алкогольної етіології.
Аміцитрон® Форте Аміцитрон® Форте Без цукру	Порошок для орального розчину №10.	Склад 1 саше: парацетамолу 650 мг, фенілефрину гідрохлориду 10 мг, феніраміну малеату 20 мг, кислоти аскорбінової 50 мг.				UA/13911/01/01 UA/13912/01/01 UA/14116/01/01 UA/14117/01/01	Гінкгоба® 	Капсули №20, №60. UA/15691/01/01 UA/15691/01/02 UA/15691/01/03	Склад 1 капсули: гінкго екстракту сухого (Folium Ginkgo) (39,6-49,5:1) (екстрагент етанол 50 %) 40 мг, 80 мг, 120 мг.	Препарат збільшує кровотік, нормалізує мікроциркуляцію, підвищує переносимість гіпоксії, запобігає агрегації еритроцитів, гальмує фактор активації тромбоцитів.	Мебікар IC 	Таблетки №20. UA/8823/01/01 UA/8823/01/02	Склад 1 таблетки: темгіколурилу 300 мг, 500 мг.	Знімає або послаблює відчуття занепокоєння, тривоги, страху. Не порушує координацію рухів. Нормалізує перебіг сну. Має антиоксидантну активність та діє як адаптоген та церебропротектор.	Неврози та неврозоподібні стани, що супроводжуються роздратуванням, емоційною лабільністю, відчуттям тривоги та страху; кардіалгії різного генезу; для полегшення перебігу соматовегетативних проявів при передменструальному синдромі та менопаузі.
Аміцитрон® Екстратаб	Таблетки, вкриті плівковою оболонкою №10.	Склад 1 таблетки: парацетамолу 650 мг, фенілефрину гідрохлориду 10 мг, хлорфеніраміну малеату 4 мг.		UA/15130/01/01	Депролгін® IC 	Порошок для орального розчину №10. UA/20369/01/01	Склад 1 саше: декскетопрофену 25 мг.	Знеболювальний, протизапальний, жарознижувальний засіб.	Слабий або помірно виражений гострий біль, у тому числі м'язово-скелетний біль, менструальний біль, зубний біль.	Мематон® IC 	Таблетки вкриті плівковою оболонкою №30. UA/16535/01/01 UA/16535/01/02	Склад 1 таблетки: мепамтану гідрохлориду 10 мг, 20 мг.	Потенціалзалежний, середньої афінності неконкурентний антагоніст NMDA-рецепторів. Модулює ефекти патологічно підвищених рівнів глутамату, які можуть призвести до дисфункції нейронів.	Хвороба Альцгеймера від легкого ступеня тяжкості до тяжких форм.	
Аміцитрон® плюс Аміцитрон® плюс Без цукру 	Порошок для орального розчину №10. UA/16181/01/01 UA/16182/01/01	Склад 1 саше: парацетамолу 500 мг, гвайфенезину 200 мг, фенілефрину гідрохлориду 10 мг.	Засіб проти кашлю з жарознижувальним, беззаспокійливим та судинорозширювальним ефектами.	Лікування симптомів застуди та грипу: головний біль, біль та ломота у тілі, біль у горлі, закладеність носа, підвищена температура тіла, продуктивний кашель з утрудненим відходженням мокротиння.	Докулак® IC 	Таблетки вкриті плівковою оболонкою №10. UA/17963/01/02	Склад 1 таблетки: докузату натрію 100 мг.	Проносний засіб, який сприяє проникненню рідини у накопичені тверді, сухі калові маси.	Лікування запорів — для пом'якшення твердих, сухих калових мас, а також для запобігання їх утворення з метою зменшення напруги при дефекації.	Нообут® IC 	Таблетки №20. UA/8831/01/01 UA/8831/01/02 Порошок для орального розчину №10. UA/8831/02/01 UA/8831/02/02	Склад 1 таблетки: фенібуту 100 мг, 250 мг. Склад 1 саше: фенібуту 100 мг, 500 мг.	Стимулює процеси навчання, покращує пам'ять, підвищує фізичну та розумову працездатність. Усуває психоемоційне напруження, тривожність, страх, дратівливість, покращує сон.	Зниження інтелектуальної та емоційної активності, порушення пам'яті, зниження концентрації уваги. Неспокій, страх, тривожність.	
Анальгін-Дибазол-Папаверин 	Таблетки №10. UA/15689/01/01	Склад 1 таблетки: метамізолу натрію моногідрату 250 мг, бендазолу гідрохлориду 20 мг, папаверину гідрохлориду 20 мг.	Комбінований препарат з анагезивним, спазмолітичним, судинорозширювальним, антигіпертензивним та жарознижувальним ефектами.	Больовий синдром, пов'язаний зі спазмом судин або гладких м'язів внутрішніх органів.	Інтагра® IC 	Таблетки вкриті оболонкою №1, №4. UA/12352/01/01 UA/12352/01/02 UA/12352/01/03	Склад 1 таблетки: силденафілу цитрату 25 мг, 50 мг, 100 мг.	Засіб, що застосовується при еректильній дисфункції.	Лікування порушень ерекції, що визначаються як неадекватність досягти та підтримати ерекцію статевого члена, необхідну для успішного статевого акту.	Паракод IC® 	Таблетки №10. UA/12054/01/01	Склад 1 таблетки: парацетамолу 500 мг та кодеїну фосфату гемідрату 8 мг.	Комбінований знеболювальний і жарознижувальний засіб.	Для короточасного лікування гострого помірного болю.	
Андифен IC 	Таблетки №10. UA/15886/01/01	Склад 1 таблетки: метамізолу натрію моногідрату 250 мг, фенобарбіталу 20 мг, папаверину гідрохлориду 20 мг, бендазолу гідрохлориду 20 мг.	Комбінований препарат з анагезивним, спазмолітичним і судинорозширювальним ефектами, обумовленими специфічною дією його компонентів. Препарат чинить також антигіпертензивну та жарознижувальну дію.	Больовий синдром, пов'язаний зі спазмом судин або гладких м'язів внутрішніх органів; артеріальна гіпертензія.	Бафазол IC® 	Таблетки №40. UA/18761/01/01	Склад 1 таблетки: фабомотизолу дигідрохлориду 10 мг.	Селективний небензодіазепіновий ансіолітик.	Лікування генералізованих тривожних розладів, неврастенії, розладів адаптації.	Кодтерпін IC® 	Таблетки №10. UA/8689/01/01	Склад 1 таблетки: кодеїну 8 мг, терпінгідрату 250 мг, натрію гідрокарбонату 250 мг.	Комбінований протикашльовий засіб.	Непродуктивний кашель при захворюваннях легень і дихальних шляхів.	

Інформація в таблиці викладена стисло. Детальна інформація наведена в інструкції для медичного застосування.

Інформація в таблиці викладена стисло. Детальна інформація наведена в інструкції для медичного застосування.

Інформація в таблиці викладена стисло. Детальна інформація наведена в інструкції для медичного застосування.